

Code référentiel MNHN (TAXREF 10)	Famille du taxon	Nom latin du taxon avec descripteur	Nom vernaculaire du taxon	Principales alliances régionales	Habitats régionaux mentionnés dans la bibliographie	Principales plantes-hôtes	Eco-complexes			Espèce disparue	Espèce présumée disparue*
							ouverts, secs à mésophiles	zones humides	forestiers		
53248	Hesperiidae	<i>Pyrgus cirsii</i> (Rambur, 1839)	Hespérie des Cirses (L')	<i>Festucion guestfalico - filiformis</i> , <i>Koeleria macranthae - Phleion phleoidis</i> , <i>Mesobromion erecti</i> , <i>Violion caninae</i> , <i>Xerobromion erecti</i>	Pelouses sèches et prairies maigres fleuries calcicoles.	<i>Potentilla tabernaemontani</i>	++			Oui	
54080	Lycaenidae	<i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802)	Cuivré des marais (Le)	<i>Apion nodiflori</i> , <i>Calthion palustris</i> , <i>Oenanthion aquatica</i> , <i>Bromion racemosi</i> , <i>Juncion acutiflori</i> , <i>Mentha longifoliae - Juncion inflexi</i> , <i>Cynosurion cristati</i> , <i>Potentillion anserinae</i> , <i>Oenanthion fistulosae</i> , <i>Arrhenatherion elatioris</i> , <i>Convolvulion sepium</i> , <i>Impatiens noli-tangere - Stachyion sylvaticae</i>	Prairies pâturées ou de fauche, lisières et clairières forestières, bordure de bas marais, milieux rudéraux, friches, jachères, bords de chemins. Préférence pour les sols frais et humides.	<i>Rumex crispus</i> , <i>R. conglomeratus</i> , <i>R. obtusifolius</i> , <i>R. hydrolapathum</i>	+	++			
54087	Lycaenidae	<i>Phengaris alcon</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Azuré de la Gentiane pneumonanthe (L')	<i>Conopodio majoris - Teucrion scorodoniae</i> , <i>Juncion acutiflori</i> , <i>Molinion caeruleae</i> , <i>Violion caninae</i> , <i>Oxycocco palustris - Ericion tetralicis</i> , <i>Mesobromion erecti</i>	Marais, prairies marécageuses, tourbières et pelouses marécageuses avec présence de fourmières (<i>Myrmica scabrinodis</i> principalement).	<i>Gentiana pneumonanthe</i>		++			
53425	Lycaenidae	<i>Phengaris teleius</i> (Bergsträsser, 1779)	Azuré de la Sanguisorbe (L')	<i>Achilleo ptarmicae - Cirsion palustris</i> , <i>Aegopodion podagrariae</i> , <i>Arrhenatherion elatioris</i> , <i>Bromion racemosi</i> , <i>Calthion palustris</i> , <i>Impatiens noli-tangere - Stachyion sylvaticae</i> , <i>Juncion acutiflori</i> , <i>Molinion caeruleae</i> , <i>Salicion albae</i> , <i>Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae</i>	Prairies riveraines, marécageuses et tourbières avec présence de fourmières (<i>Myrmica scabrinodis</i> principalement)..	<i>Sanguisorba officinalis</i>		++			
53856	Lycaenidae	<i>Phengaris arion</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré du Serpolet (L')	<i>Alyssa alyssoidis - Sedion albi</i> , <i>Arrhenatherion elatioris</i> , <i>Arction lappae</i> , <i>Bromo - Hardeion murini</i> , <i>Conopodio majoris - Teucrion scorodoniae</i> , <i>Corynephorion</i> , <i>Cynosurion cristati</i> , <i>Festucion guestfalico - filiformis</i> , <i>Geranion sanguinei</i> , <i>Koeleria macranthae - Phleion phleoidis</i> , <i>Mesobromion erecti</i> , <i>Sileno conicae - Cerastion semidecandri</i> , <i>Thero airion</i> , <i>Trifolion medii</i> , <i>Xerobromion erecti</i>	Pelouses sèches, prairies maigres, friches herbeuses, lisières thermophiles. Présence de fourmières (<i>Myrmica sabuleti</i> et <i>Myrmica rubra</i>).	<i>Origanum vulgare</i> , (<i>Thymus sp.</i>)	++				
53651	Nymphalidae	<i>Chazara briseis</i> (Linnaeus, 1764)	Hermite (L')	<i>Alyssa alyssoidis - Sedion albi</i> , <i>Festucion guestfalico - filiformis</i> , <i>Mesobromion erecti</i> , <i>Sileno conicae - Cerastion semidecandri</i> , <i>Xerobromion erecti</i>	Pelouses sèches calcicoles à végétation basse et éparses.	<i>Festuca gr. ovina</i> , <i>Sesleria caerulea</i> .	++				
53621	Nymphalidae	<i>Euphydryas maturna</i> (Linnaeus, 1758)	Damier du Frêne (Le)	<i>Aegopodion podagrariae</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Berberidion vulgaris</i> , <i>Carpino betuli - Fagion sylvaticae</i> , <i>Conopodio majoris - Teucrion scorodoniae</i> , <i>Frangulo dodonei - Quercion roboris</i> , <i>Fraxino excelsioris - Quercion roboris</i> , <i>Geo urbani - Alliarion petiolatae</i> , <i>Geranion sanguinei</i> , <i>Impatiens noli-tangere - Stachyion sylvaticae</i> , <i>Molinia caeruleae - Quercion roboris</i> , <i>Tilio platyphylli - Acerion pseudoplatani</i> , <i>Trifolion medii</i> , <i>Quercion pubescenti - sessiliflorae</i> , <i>Quercion roboris</i> , <i>Quercion robori - pyrenaicae</i> , <i>Rubo caesii - Populion nigrae</i> , <i>Rubo ulmifolii - Viburnion lantanae</i> , <i>Violo riviniana - Stellarion holostea</i>	Sous-bois clairs et frais, lisières et coupes forestières de feuillus.	<i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Viburnum opulus</i> , <i>Veronica chamaedrys</i> , <i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Melampyrum sylvaticum</i> , <i>M. pratense</i>			++		
53615	Nymphalidae	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	Damier de la Succise (Le)	<i>Alnion incanae</i> , <i>Alnion glutinosae</i> , <i>Arrhenatherion elatioris</i> , <i>Brachypodio rupestris - Centaureion nemoralis</i> , <i>Bromion racemosi</i> , <i>Conopodio majoris - Teucrion scorodoniae</i> , <i>Cynosurion cristati</i> , <i>Geranion sanguinei</i> , <i>Juncion acutiflori</i> , <i>Molinion caeruleae</i> , <i>Mesobromion erecti</i> , <i>Sambuco racemosae - Salicion capreae</i> , <i>Salicion albae</i> , <i>Salici cinereae - Viburnion opuli</i> , <i>Trifolion medii</i> , <i>Violion caninae</i> ,	Prairies maigres mésophiles et humides, landes humides, bas marais, tourbières, allées forestières acides ou calcaires pour l'écotype <i>aurinia</i> , pelouses calcicoles et coteaux calcaires pour l'écotype <i>xeraurinia</i> .	<i>Succisa pratensis</i> , <i>Knautia arvensis</i> , <i>Scabiosa colombaria</i>	+	++	++		
53979	Nymphalidae	<i>Coenonympha hero</i> (Linnaeus, 1760)	Mélitée (Le)	<i>Alnion incanae</i> , <i>Arrhenatherion elatioris</i> , <i>Betulion pubescentis</i> , <i>Caricion remotae</i> , <i>Carici piluliferae - Epilobion angustifolii</i> , <i>Clematido vitalbae - Acerion campestris</i> , <i>Conopodio majoris - Teucrion scorodoniae</i> , <i>Dauco carotae - Melilotion albi</i> , <i>Fraxino excelsioris - Quercion roboris</i> , <i>Impatiens noli-tangere - Stachyion sylvaticae</i> , <i>Juncion acutiflori</i> , <i>Molinion caeruleae</i> , <i>Quercion pubescenti - sessiliflorae</i> , <i>Rubo caesii - Populion nigrae</i> , <i>Salicion-albae</i> , <i>Trifolion medii</i>	Prairies humides et tourbières en milieu forestier ou lisière.	<i>Hardelymus europaeus</i> , <i>Deschampsia cespitosa</i> , <i>Brachypodium rupestre</i> , <i>Poa annua</i> , <i>Festuca sp.</i> , <i>Calamagrostis sp.</i> , <i>Carex remota</i> .		++	+	Oui	
54085	Nymphalidae	<i>Coenonympha oedippus</i> (Fabricius, 1787)	Fadet des Laïches (Le)	<i>Agrastion curtisii</i> , <i>Alnion glutinosae</i> , <i>Betulion pubescentis</i> , <i>Caricion fuscae</i> , <i>Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis</i> , <i>Juncion acutiflori</i> , <i>Molinion caeruleae</i> , <i>Molinia caeruleae - Quercion roboris</i> , <i>Nardo strictae - Juncion squarrosi</i> , <i>Osmundo regalis - Myricion gale</i> , <i>Oxycocco palustris - Ericion tetralicis</i> , <i>Sphagno - Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae</i> , <i>Trifolion medii</i> , <i>Quercion robori - pyrenaicae</i> , <i>Ulicion minoris</i>	Prairies humides et marécageuses riches en Molinie.	<i>Molinia caerulea</i>		++	+	Oui	
53865	Nymphalidae	<i>Lopinga achine</i> (Scopoli, 1763)	Bacchante (La), Déjanire (La)	<i>Clematido vitalbae - Acerion campestris</i> , <i>Fraxino excelsioris - Quercion roboris</i> , <i>Geranion sanguinei</i> , <i>Koeleria macranthae - Phleion phleoidis</i> , <i>Mesobromion erecti</i> , <i>Molinion caeruleae</i> , <i>Trifolion medii</i> , <i>Quercion pubescenti - sessiliflorae</i> , <i>Carpinion betulii</i> , <i>Tilio platyphylli - Acerion pseudoplatani</i> , <i>Trifolion medii</i>	Lisières, clairières et allées des boisements clairs, secs ou humides sur sol calcaire.	<i>Brachypodium sp.</i> , <i>Poa pratensis</i> , <i>Festuca gr. rubra</i> , <i>Deschampsia cespitosa</i> , <i>Luzula pilosa</i> , <i>Carex montana</i> .			++		
608241	Hesperiidae	<i>Carcharodus floccifer</i> (Zeller, 1847)	Hespérie du Marrube (L')	<i>Arrhenatherion elatioris</i> , <i>Brachypodio rupestris - Centaureion nemoralis</i> , <i>Conopodio-Teucrion</i> , <i>Juncion acutiflori</i> , <i>Koeleria macranthae - Phleion phleoidis scorodoniae</i> , <i>Mesobromion erecti</i> , <i>Molinion caeruleae</i> , <i>Trifolion medii</i> , <i>Xerobromion erecti</i>	Prairies, clairières et bords des chemins frais et fleuris des milieux forestiers	<i>Betonica (=Stachys) officinalis</i> , <i>Stachys recta</i>	++		+		Oui
53229	Hesperiidae	<i>Pyrgus alveus</i> (Hübner, 1803)	Hespérie du Faux-Buis (L')	<i>Geranion sanguinei</i> , <i>Koeleria macranthae - Phleion phleoidis</i> , <i>Mesobromion erecti</i> , <i>Xerobromion erecti</i> , <i>Violion caninae</i>	Pelouses calcicoles	<i>Helianthemum nummularium</i>	++			Oui	
53242	Hesperiidae	<i>Pyrgus serratalae</i> (Rambur, 1839)	Hespérie de l'Alchémille (L')	<i>Arrhenatherion elatioris</i> , <i>Brachypodio rupestris - Centaureion nemoralis</i> , <i>Festucion guestfalico - filiformis</i> , <i>Koeleria macranthae - Phleion phleoidis</i> , <i>Mentha longifoliae - Juncion inflexi</i> , <i>Mesobromion erecti</i> , <i>Potentillion anserinae</i> , <i>Xerobromion erecti</i> , <i>Violion caninae</i>	Pelouses calcicoles ou sableuses à végétation lacunaire et où la roche affleure ainsi que carrières et bords des chemins	<i>Potentilla verna</i> , <i>P. recta</i> , <i>P. reptans</i>	++				
53236	Hesperiidae	<i>Pyrgus armoricanus</i> (Oberthür, 1910)	Hespérie des Potentilles (L')	<i>Arrhenatherion elatioris</i> , <i>Brachypodio rupestris - Centaureion nemoralis</i> , <i>Bromion racemosi</i> , <i>Carpinion betulii</i> , <i>Carpino betulii - Fagion sylvaticae</i> , <i>Conopodio majoris - Teucrion scorodoniae</i> , <i>Cynosurion cristati</i> , <i>Fraxino excelsioris - Quercion roboris</i> , <i>Festucion guestfalico - filiformis</i> , <i>Gallio saxatilis - Festucion filiformis</i> , <i>Geranion sanguinei</i> , <i>Holco mollis - Pteridion aquilini</i> , <i>Juncion acutiflori</i> , <i>Koeleria macranthae - Phleion phleoidis</i> , <i>Mentha longifoliae - Juncion inflexi</i> , <i>Mesobromion erecti</i> , <i>Molinion caeruleae</i> , <i>Oxycocco palustris - Ericion tetralicis</i> , <i>Potentillion anserinae</i> , <i>Potentillo erectae - Holcion mollis</i> , <i>Sambuco racemosae - Salicion capreae</i> , <i>Thero-Airion</i> , <i>Trifolion medii</i> , <i>Xerobromion erecti</i> , <i>Violo riviniana - Stellarion holostea</i> , <i>Violion caninae</i> , <i>Ulicion minoris</i>	Pelouses sèches, prairies mésophiles à hygrophiles, talus ensoleillés, clairières et lisières de chênaie	<i>Potentilla verna</i> , <i>Potentilla reptans</i> , <i>P. sterilis</i> , <i>P. recta</i> , <i>P. erecta</i> , <i>Helianthemum nummularium</i> , <i>Filipendula vulgaris</i> , <i>Fragaria vesca</i>	++	+	+		
53332	Hesperiidae	<i>Hesperia comma</i> (Linnaeus, 1760)	Virgule (La)	<i>Alyssa alyssoidis - Sedion albi</i> , <i>Brachypodio rupestris - Centaureion nemoralis</i> , <i>Cynosurion cristati</i> , <i>Dauco carotae - Melilotion albi</i> , <i>Festucion guestfalico - filiformis</i> , <i>Gallio saxatilis - Festucion filiformis</i> , <i>Geranion sanguinei</i> , <i>Juncion acutiflori</i> , <i>Koeleria macranthae - Phleion phleoidis</i> , <i>Lollo perennis - Plantaginon majoris</i> , <i>Mesobromion erecti</i> , <i>Miboro - Corynephorion canescens</i> , <i>Molinion caeruleae</i> , <i>Nardo strictae - Juncion squarrosi</i> , <i>Sedo micranthi - Corynephorion canescens</i> , <i>Sileno conicae - Cerastion semidecandri</i> , <i>Violion caninae</i> , <i>Xerobromion erecti</i>	Pelouses sèches ou mésophiles, landes herbeuses à végétation rase	<i>Lotus corniculatus</i> , <i>Coronilla sp.</i> , <i>Hippocrepis comosa</i> , <i>Festuca gr. ovina</i> , <i>Nardus stricta</i> , <i>Festuca rubra</i> , <i>Festuca pratensis</i> , <i>Festuca ovina</i> , <i>Deschampsia flexuosa</i> , <i>Corynephorus canescens</i> , <i>Agrostis vinealis</i>	++	+			

54433	Pieridae	<i>Euchloe crameri</i> (Butler, 1869)	Piériide des Biscutelles (La)	<i>Caucalidion</i> , <i>Convolvulo arvensis</i> - <i>Agropyron repens</i> , <i>Dauco carotae</i> - <i>Melilotion albi</i> , <i>Mesobromion erecti</i> , <i>Onopordion acanthii</i> , <i>Panico cruris-galli</i> - <i>Setarion viridis</i>	Milieux ouverts variés : pelouses sèches, friches, cultures	<i>Reseda lutea</i> , <i>Reseda luteola</i> , <i>Reseda alba</i> , <i>Sinapis arvensis</i> , <i>S. alba</i> , <i>Isatis tinctoria</i> , <i>Diplotaxis tenuifolia</i>	++					Oui	
54362	Pieridae	<i>Pontia daplidice</i> (Linnaeus, 1758)	Marbré-de-vert (Le)	<i>Panico cruris-galli</i> - <i>Setarion viridis</i> , <i>Scleranthion annui</i>	Milieux ouverts variés : pelouses sèches, friches, cultures, landes sablonneuses à Corynéphores	<i>Sinapis alba</i> , <i>Diplotaxis tenuifolia</i> , <i>Lepidium campestre</i> , <i>L. ruderale</i> , <i>Raphanus raphanistrum</i> , <i>Thlaspi arvense</i> , <i>Arabis hirsuta</i>	++					Oui	
219760	Lycaenidae	<i>Satyrium acaciae</i> (Fabricius, 1787)	Thécla de l'Amarel (La)	<i>Alnion incanae</i> , <i>Geranion sanguinei</i> , <i>Lonicerion periclymeni</i> , <i>Rubo ulmifolii</i> - <i>Viburnum lantanae</i> , <i>Berberidion vulgare</i> , <i>Humulo lupuli</i> - <i>Sambucion nigrae</i> , <i>Pruno spinosae</i> - <i>Rubion radulae</i> , <i>Sambuco racemosae</i> - <i>Salicion capreae</i>	Lisières, clairières, bords de chemins riches en prunellier	<i>Prunus spinosa</i>	++		+				
54055	Lycaenidae	<i>Pseudophilotes baton</i> (Bergsträsser, 1779)	Azuré du Thym (L')	<i>Alyso alyssoidis</i> - <i>Sedion albi</i> , <i>Arction lappae</i> , <i>Arrhenatherion elatioris</i> , <i>Bromo</i> - <i>Hordeion murini</i> , <i>Conopodio majoris</i> - <i>Teucrion scorodoniae</i> , <i>Corynephorion</i> , <i>Cynosurion cristati</i> , <i>Festucion guestfalico</i> - <i>filiformis</i> , <i>Koelerio macranthae</i> - <i>Phleion phleoidis</i> , <i>Thero airion</i> , <i>Viollion caninae</i> , <i>Mesobromion erecti</i> , <i>Sileno conicae</i> - <i>Cerastion semidecandri</i> , <i>Viollion caninae</i> , <i>Xerobromion erecti</i>	Pelouses sèches caillouteuses, pelouses rases mésophiles et landes sèches ouvertes	<i>Thymus pulegioides</i> , <i>Thymus praecox</i>	++						
54126	Lycaenidae	<i>Plebejus idas</i> (Linnaeus, 1760)	Azuré du Genêt (L')	<i>Alyso alyssoidis</i> - <i>Sedion albi</i> , <i>Arrhenatherion elatioris</i> , <i>Brachypodio rupestris</i> - <i>Centaureion nemoralis</i> , <i>Conopodio majoris</i> - <i>Teucrion scorodoniae</i> , <i>Cynosurion cristati</i> , <i>Dauco carotae</i> - <i>Melilotion albi</i> , <i>Equiseto ramosissimi</i> - <i>Elytrigion campestris</i> , <i>Juncion acutiflori</i> , <i>Geo urbani</i> - <i>Alliarion petiolatae</i> , <i>Geranion sanguinei</i> , <i>Koelerio macranthae</i> - <i>Phleion phleoidis</i> , <i>Lonicerion periclymeni</i> , <i>Lolio perennis</i> - <i>Plantaginon majoris</i> , <i>Molinion caeruleae</i> , <i>Mesobromion erecti</i> , <i>Nardo strictae</i> - <i>Juncion squarrosi</i> , <i>Rubo caesii</i> - <i>Populion nigrae</i> , <i>Sarothamion scoparii</i> , <i>Scleranthion annui</i> , <i>Trifolion medii</i> , <i>Viollion caninae</i> , <i>Xerobromion erecti</i> , <i>Ulici europaei</i> - <i>Cytision striati</i> , <i>Violo riviniana</i> - <i>Stellarion holostea</i>	Pelouses sèches, prairies humides et landes ouvertes sèches ou humides, souvent sur sols sablonneux ou pierreux avec peu de végétation	<i>Cytisus scoparius</i> , <i>Lotus corniculatus</i> , <i>Astragalus onobrychis</i> , <i>A. glycyphyllos</i> , <i>Anthyllis vulneraria</i> , <i>Melilotus alba</i> , <i>M. officinalis</i> , <i>Medicago sativa</i> , <i>Colutea arborescens</i> , <i>Genista tinctoria</i> , <i>Onobrychis viciifolia</i> , <i>Securigera varia</i> , <i>Spartium junceum</i> , <i>Vicia cracca</i> , <i>V. villosa</i>	++		+				
54105	Lycaenidae	<i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré de l'Ajonc (L')	<i>Alyso alyssoidis</i> - <i>Sedion albi</i> , <i>Geranion sanguinei</i> , <i>Koelerio macranthae</i> - <i>Phleion phleoidis</i> , <i>Mesobromion erecti</i> , <i>Oxyccoco palustris</i> - <i>Ericion tetralicis</i> , <i>Xerobromion erecti</i> , <i>Ulici europaei</i> - <i>Cytision striati</i> , <i>Viollion caninae</i>	Pelouses fleuries, prairies mésophiles, landes sèches, landes humides ou tourbières acides et lisières thermophiles	<i>Thymus praecox</i> , <i>Ulex europaeus</i> , <i>Securigera varia</i> , <i>Ornithopus perpusillus</i> , <i>Onobrychis supina</i> , <i>Medicago lupulina</i> , <i>Lotus corniculatus</i> , <i>Hippocrepis comosa</i> , <i>Genista anglica</i> , <i>Cytisus scoparius</i> , <i>Colutea arborescens</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Erica tetralix</i> , <i>E. cinerea</i> , <i>Calluna vulgaris</i> , <i>Helianthemum nummularium</i> , <i>Quercion roboris</i>	++		++				
53915	Nymphalidae	<i>Brenthis ino</i> (Rottemburg, 1775)	Nacré de la Sanguisorbe (Le)	<i>Achilleo ptarmicae</i> - <i>Cirsion palustris</i> , <i>Aegopodion podagrariae</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Alnion glutinosae</i> , <i>Arrhenatherion elatioris</i> , <i>Bromion racemosi</i> , <i>Calthion palustris</i> , <i>Convolvulion sepium</i> , <i>Impatienti noli-tangere</i> - <i>Stachyion sylvaticae</i> , <i>Juncion acutiflori</i> , <i>Mesobromion erecti</i> , <i>Molinion caeruleae</i> , <i>Salicion albae</i> , <i>Thalictrio flavi</i> - <i>Filipendulion ulmariae</i>	Prairies humides et marécageuses, tourbières, pelouses marnicoles, lisières et clairières fleuries	<i>Filipendula ulmaria</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>			++				
219815	Nymphalidae	<i>Boloria euphrosyne</i> (Linnaeus, 1758)	Grand collier argenté (Le)	<i>Carpinon betuli</i> , <i>Fraxino-Quercion</i> , <i>Geo urbani</i> - <i>Alliarion petiolatae</i> , <i>Carpino betuli</i> - <i>Fagion sylvaticae</i> , <i>Conopodio majoris</i> - <i>Teucrion scorodoniae</i> , <i>Geranion sanguinei</i> , <i>Lonicerion periclymeni</i> , <i>Mesobromion erecti</i> , <i>Quercion robori pyrenaicae</i> , <i>Quercion pubescenti</i> - <i>sessiliflorae</i> , <i>Trifolion medii</i> , <i>Ulicion minoris</i> , <i>Violo riviniana</i> - <i>Stellarion holostea</i> , <i>Viollion caninae</i>	Allées forestières ensoleillées, lisières et clairières des boisements plutôt calcaires mésophiles à thermophiles	<i>Viola hirta</i> , <i>V. odorata</i> , <i>V. reichenbachiana</i> , <i>V. riviniana</i>	+			++			
219817	Nymphalidae	<i>Boloria selene</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Petit Collier argenté (Le)	<i>Carpino betuli</i> - <i>Fagion sylvaticae</i> , <i>Conopodio majoris</i> - <i>Teucrion scorodoniae</i> , <i>Geranion sanguinei</i> , <i>Juncion acutiflori</i> , <i>Lonicerion periclymeni</i> , <i>Trifolion medii</i> , <i>Quercion robori pyrenaicae</i> , <i>Viollion caninae</i> , <i>Ulicion minoris</i>	Allées forestières ensoleillées, lisières et clairières des boisements plutôt acides et humides, tourbières, marais, landes et prairies humides à mésophiles.	<i>Viola canina</i> , <i>V. riviniana</i>			+		++		
53794	Nymphalidae	<i>Melitaea didyma</i> (Esper, 1778)	Mélitée orangée (La)	<i>Aegopodion podagrariae</i> , <i>Arrhenatherion elatioris</i> , <i>Brachypodio rupestris</i> - <i>Centaureion nemoralis</i> , <i>Bromion racemosi</i> , <i>Carpino betuli</i> - <i>Fagion sylvaticae</i> , <i>Conopodio majoris</i> - <i>Teucrion scorodoniae</i> , <i>Danthonio decumbentis</i> - <i>Serapiadion linguae</i> , <i>Dauco carotae</i> - <i>Melilotion albi</i> , <i>Geo urbani</i> - <i>Alliarion petiolatae</i> , <i>Impatienti noli-tangere</i> - <i>Stachyion sylvaticae</i> , <i>Juncion acutiflori</i> , <i>Koelerio macranthae</i> - <i>Phleion phleoidis</i> , <i>Lolio perennis</i> - <i>Plantaginon majoris</i> , <i>Mesobromion erecti</i> , <i>Molinion caeruleae</i> , <i>Potentillion anserinae</i> , <i>Ranunculo repentis</i> - <i>Cynosurion cristati</i> , <i>Trifolio fragiferi</i> - <i>Cynodontion dactyli</i> , <i>Trifolion medii</i> , <i>Viollion caninae</i> , <i>Violo riviniana</i> - <i>Stellarion holostea</i>	Pelouses sèches, prairies mésophiles, bords des cultures et chemins, landes ouvertes.	<i>Veronica austriaca</i> , <i>V. chamaedrys</i> , <i>Verbascum thapsus</i> , <i>Verbascum nigrum</i> , <i>V. lychnitis</i> , <i>Scrophularia canina</i> , <i>Rhinanthus angustifolius</i> , <i>Melampyrum arvense</i> , <i>Linaria vulgaris</i> , <i>L. repens</i> , <i>L. genistifolia</i> , <i>Digitalis purpurea</i> , <i>Cymbalaria muralis</i> , <i>Plantago media</i> , <i>P. major</i> , <i>P. lanceolata</i> , <i>Stachys recta</i> , <i>Melittis melissophyllum</i> , <i>Centaurea scabiosa</i> , <i>C. paniculata</i> , <i>Achillea millefolium</i>	++						
53821	Nymphalidae	<i>Melitaea diamina</i> (Lang, 1789)	Mélitée noirâtre (La)	<i>Alnion incanae</i> , <i>Alnion glutinosae</i> , <i>Juncion acutiflori</i> , <i>Molinion caeruleae</i> , <i>Thalictrio flavi</i> - <i>Filipendulion ulmariae</i>	Prairies humides ou mésophiles bordées de haies, lisières forestières, clairières et tourbières.	<i>Valeriana dioica</i> , <i>V. officinalis</i>			++		+		
219810	Nymphalidae	<i>Melitaea parthenoides</i> (Keferstein, 1851)	Mélitée de la Lancéole (La)	<i>Arrhenatherion elatioris</i> , <i>Brachypodio rupestris</i> - <i>Centaureion nemoralis</i> , <i>Bromion racemosi</i> , <i>Cynosurion cristati</i> , <i>Danthonio decumbentis</i> - <i>Serapiadion linguae</i> , <i>Dauco carotae</i> - <i>Melilotion albi</i> , <i>Juncion acutiflori</i> , <i>Koelerio macranthae</i> - <i>Phleion phleoidis</i> , <i>Lolio perennis</i> - <i>Plantaginon majoris</i> , <i>Mesobromion erecti</i> , <i>Molinion caeruleae</i> , <i>Potentillion anserinae</i> , <i>Ranunculo repentis</i> - <i>Cynosurion cristati</i> , <i>Trifolio fragiferi</i> - <i>Cynodontion dactyli</i> , <i>Viollion caninae</i>	Prairies maigres sèches ou humides, friches, jachères et pelouses sèches herbeuses.	<i>Plantago lanceolata</i>	++		+				
53765	Nymphalidae	<i>Limnitis populi</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Sylvain (Le)	<i>Alnion incanae</i> , <i>Sambuco racemosae</i> - <i>Salicion capreae</i> , <i>Salicion cinerea</i> , <i>Alnion glutinosae</i>	Lisières, clairières et allées forestières ensoleillées, humides à mésophiles.	<i>Populus tremula</i>				++			
53609	Nymphalidae	<i>Lasioommata maera</i> (Linnaeus, 1758)	Némusien (Le)	<i>Alyso alyssoidis</i> - <i>Sedion albi</i> , <i>Festucion guestfalico</i> - <i>filiformis</i> , <i>Mesobromion erecti</i> , <i>Sileno conicae</i> - <i>Cerastion semidecandri</i> , <i>Viollion caninae</i> , <i>Xerobromion erecti</i>	Pelouses sèches, lisières thermophiles sur sols caillouteux	<i>Brachypodium sp.</i> , <i>Festuca gr. ovina</i> , <i>Poa bulbosa</i>	++						
53370	Nymphalidae	<i>Arethusa arethusa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Mercure (Le), Petit Agreste (Le)	<i>Alyso alyssoidis</i> - <i>Sedion albi</i> , <i>Mesobromion erecti</i> , <i>Sileno conicae</i> - <i>Cerastion semidecandri</i> , <i>Xerobromion erecti</i>	Pelouses calcicoles avec des secteurs plus ou moins écorchés.	<i>Bromus erectus</i> , <i>Festuca gr. ovina</i>	++						
53391	Nymphalidae	<i>Hipparchia semele</i> (Linnaeus, 1758)	Agreste (L')	<i>Alyso alyssoidis</i> - <i>Sedion albi</i> , <i>Festucion guestfalico</i> - <i>filiformis</i> , <i>Mesobromion erecti</i> , <i>Sileno conicae</i> - <i>Cerastion semidecandri</i> , <i>Xerobromion erecti</i>	Pelouses sèches calcicoles, landes acidiphiles et pinède.	<i>Aira praecox</i> , <i>Deschampsia sp.</i> , <i>Festuca gr. ovina</i>	++						
219806	Nymphalidae	<i>Hipparchia statilinus</i> (Hufnagel, 1766)	Faune (Le)	<i>Alyso alyssoidis</i> - <i>Sedion albi</i> , <i>Festucion guestfalico</i> - <i>filiformis</i> , <i>Mesobromion erecti</i> , <i>Sileno conicae</i> - <i>Cerastion semidecandri</i> , <i>Viollion caninae</i> , <i>Xerobromion erecti</i>	Pelouses et landes sèches souvent sur sols sablonneux.	<i>Festuca gr. ovina</i> , <i>Bromus erectus</i> , <i>Festuca rubra</i>	++					Oui	
53376	Nymphalidae	<i>Hipparchia fagi</i> (Scopoli, 1763)	Sylvandre (Le)	<i>Xerobromion erecti</i> , <i>Mesobromion erecti</i> , <i>Conopodio majoris</i> - <i>Teucrion scorodoniae</i> , <i>Juncion acutiflori</i> , <i>Molinion caeruleae</i> , <i>Quercion pubescenti</i> - <i>sessiliflorae</i> , <i>Geranion sanguinei</i> , <i>Trifolion medii</i> , <i>Arrhenatherion elatioris</i> , <i>Dauco carotae</i> - <i>Melilotion albi</i> , <i>Clematido vitalbae</i> - <i>Acerion campestris</i> , <i>Mesobromion erecti</i> , <i>Xerobromion erecti</i> , <i>Koelerio macranthae</i> - <i>Phleion phleoidis</i>	Pelouses sèches buissonneuses et boisements clairs thermophiles	<i>Brachypodium rupestre</i> , <i>Bromus erectus</i> , <i>Festuca gr. ovina</i>	++			++			

53487	Nymphalidae	<i>Erebia medusa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Moiré franconien (Le)	<i>Mesobromion erecti</i> , <i>Conopodio majoris</i> - <i>Teucrium scorodoniae</i> , <i>Juncion acutiflori</i> , <i>Molinion caeruleae</i> , <i>Quercion pubescenti</i> - <i>sessiliflorae</i> , <i>Geranion sanguinei</i> , <i>Trifolium medii</i> , <i>Arrhenatherion elatioris</i> , <i>Daucu carotae</i> - <i>Mellilotion albi</i> , <i>Clematido vitalbae</i> - <i>Acerion campestris</i> , <i>Mesobromion erecti</i>	Pelouses calcicoles et bois clairs mais aussi lisières et clairières humides, marge des tourbières, prairies humides ou mésophiles.	<i>Bromus erectus</i> , <i>Festuca sp.</i>	++	+	++		Oui
53483	Nymphalidae	<i>Erebia aethiops</i> (Esper, 1777)	Moiré sylvicole (Le)	<i>Mesobromion erecti</i> , <i>Quercion pubescenti</i> - <i>sessiliflorae</i> , <i>Molinia caeruleae</i> - <i>Quercion roboris</i> , <i>Geranion sanguinei</i> , <i>Trifolium medii</i> ,	Lisières et clairières des boisements calcicoles et pelouses sèches buissonnantes.	<i>Brachypodium rupestre</i> , <i>Bromus erectus</i> , <i>Festuca gr. ovina</i> , <i>Molinia caerulea</i> , <i>Briza media</i> , <i>Dactylis glomerata</i>	+		++		
53364	Nymphalidae	<i>Minois dryas</i> (Scopoli, 1763)	Grand Nègre des bois (Le)	<i>Agrostion curtisii</i> , <i>Betulion pubescentis</i> , <i>Caricion fuscae</i> , <i>Hydrocotylo vulgaris</i> - <i>Schoenion nigricantis</i> , <i>Juncion acutiflori</i> , <i>Molinion caeruleae</i> , <i>Molinia caeruleae</i> - <i>Quercion roboris</i> , <i>Nardo strictae</i> - <i>Juncion squarrosi</i> , <i>Osmundo regalis</i> - <i>Myricion gale</i> , <i>Oxycocco palustris</i> - <i>Ericion tetralicis</i> , <i>Sphagno</i> - <i>Alnion glutinosae</i> , <i>Thalictro flavi</i> - <i>Filipendulion ulmariae</i> , <i>Trifolium medii</i> , <i>Quercion roboris</i> - <i>pyrenaicae</i> , <i>Ullicion minoris</i> , <i>Mesobromion erecti</i> , <i>Geranion sanguinei</i> , <i>Quercion pubescenti</i> - <i>sessiliflorae</i>	Landes humides ou sèches, marais alcalins, prairies marécageuses, bois clairs, lisières des bois et pelouses calcicoles.	<i>Molinia caerulea</i> , <i>Bromus erectus</i> , <i>Brachypodium rupestre</i>	++	++	+		
247053	Zygaenidae	<i>Zygaena osterodensis</i> (Reiss, 1921)	Zygène d'Ostéode (La)	<i>Arrhenatherion elatioris</i> , <i>Brachypodio rupestris</i> - <i>Centaureion nemoralis</i> , <i>Conopodio majoris</i> - <i>Teucrium scorodoniae</i> , <i>Molinion caeruleae</i> , <i>Scleranthion annui</i> , <i>Trifolium medii</i>	Ourllets calcaires des lisières et clairières ensoleillées des forêts caducifoliées tempérées	<i>Vicia cracca</i> , <i>Vicia sp.</i> , <i>Lathyrus pratensis</i> , <i>Lathyrus sp.</i>			++		
247054	Zygaenidae	<i>Zygaena viciae</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Zygène des Thérésiens (La)	<i>Arrhenatherion elatioris</i> , <i>Brachypodio rupestris</i> - <i>Centaureion nemoralis</i> , <i>Mesobromion erecti</i> , <i>Trifolium medii</i> , <i>Fraxino excelsioris</i> - <i>Quercion roboris</i> ,	Pelouses calcicoles et marnicoles, forêt de feuillus et prairies mésophiles et humides	<i>Lathyrus pratensis</i> , <i>Lotus corniculatus</i> , <i>Trifolium sp.</i> , <i>Vicia cracca</i>	++		+		
247041	Zygaenidae	<i>Zygaena minos</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Zygène diaphane (La)	<i>Mesobromion erecti</i> , <i>Xerobromion erecti</i>	Coteaux et pelouses calcicoles bien exposés	<i>Pimpinella saxifraga</i>	++				
247059	Zygaenidae	<i>Zygaena loniceræ</i> (Scheven, 1777)	Zygène des bois (La)	<i>Arrhenatherion elatioris</i> , <i>Brachypodio rupestris</i> - <i>Centaureion nemoralis</i> , <i>Fraxino excelsioris</i> - <i>Quercion roboris</i> , <i>Danthonio decumbentis</i> - <i>Serapiadion linguae</i> , <i>Molinia caeruleae</i> - <i>Quercion roboris</i> , <i>Carpino betuli</i> - <i>Fagion sylvaticae</i>	Clairières des forêts claires et lisières des prairies calcicoles. Semble avoir une préférence pour les milieux frais	<i>Trifolium sp.</i> , <i>Vicia sp.</i> , <i>Lathyrus sp.</i> , <i>Lotus sp.</i> et <i>Onobrychis sp.</i>			++		
247035	Zygaenidae	<i>Zygaena sarpedon</i> (Hübner, 1790)	Zygène du Panicaut (La)	<i>Arrhenatherion elatioris</i> , <i>Equiseto ramosissimi</i> - <i>Elytrigion campestris</i> , <i>Koelerio macranthae</i> - <i>Phleion phleoidis</i> , <i>Mesobromion erecti</i> , <i>Xerobromion erecti</i>	Prairies maigres des bords de Loire, coteaux et pelouses calcicoles	<i>Eryngium campestre</i>	++				