

# Tableau des périodes d'intervention en faveur des papillons de jour

Travaux d'entretien

Famille du taxon	Nom latin du taxon	Nom vernaculaire du taxon	Ecocomplexes			Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre
			ouverts, secs à mésophiles	zones humides	forestiers								
Hesperiidae	<i>Carcharodus floccifer</i> (Zeller, 1847)	Hespérie du Marrube*	++		+								
Hesperiidae	<i>Hesperia comma</i> (Linnaeus, 1760)	Virgule	++	+									
Hesperiidae	<i>Pyrgus alveus</i> (Hübner, 1803)	Hespérie du Faux-Buis*	++										
Hesperiidae	<i>Pyrgus armoricanus</i> (Oberthür, 1910)	Hespérie des Potentilles	++	+	+								
Hesperiidae	<i>Pyrgus cirsii</i> (Rambur, 1839)	Hespérie des Cirses*	++										
Hesperiidae	<i>Pyrgus serratulae</i> (Rambur, 1839)	Hespérie de l'Alchémille	++										
Pieridae	<i>Euchloe crameri</i> (Butler, 1869)	Piéride des Biscutelles	++										
Pieridae	<i>Pontia daplidice</i> (Linnaeus, 1758)	Marbré-de-vert	++			?	?	?	?	?	?	?	?
Lycaenidae	<i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802)	Cuivré des marais	+	++									
Lycaenidae	<i>Phengaris alcon</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Azuré de la Pulmonaire		++									
Lycaenidae	<i>Phengaris arion</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré du Serpolet	++										
Lycaenidae	<i>Phengaris teleius</i> (Bergsträsser, 1779)	Azuré de la Sanguisorbe		++									
Lycaenidae	<i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré de l'Ajonc	++	++									
Lycaenidae	<i>Plebejus idas</i> (Linnaeus, 1760)	Azuré du Genêt	++	+									
Lycaenidae	<i>Pseudophilotes baton</i> (Bergsträsser, 1779)	Azuré du Thym	++										
Lycaenidae	<i>Satyrium acaciae</i> (Fabricius, 1787)	Thécla de l'Amarel	++		+								
Nymphalidae	<i>Arethusana arethusa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Mercure	++										
Nymphalidae	<i>Boloria euphrosyne</i> (Linnaeus, 1758)	Grand collier argenté	+		++								
Nymphalidae	<i>Boloria selene</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Petit Collier argenté		+	++								
Nymphalidae	<i>Brenthis ino</i> (Rottemburg, 1775)	Nacré de la Sanguisorbe		++									
Nymphalidae	<i>Chazara briseis</i> (Linnaeus, 1764)	Hermite	++										
Nymphalidae	<i>Coenonympha hero</i> (Linnaeus, 1760)	Mélibée*		++	+								
Nymphalidae	<i>Coenonympha oedippus</i> (Fabricius, 1787)	Fadet des Laïches*		++	+								
Nymphalidae	<i>Erebia aethiops</i> (Esper, 1777)	Moiré sylvicole	+		++								
Nymphalidae	<i>Erebia medusa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Moiré franconien*	++	+	++								
Nymphalidae	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	Damier de la Succise	+	++	++								
Nymphalidae	<i>Euphydryas maturna</i> (Linnaeus, 1758)	Damier du Frêne			++								
Nymphalidae	<i>Hipparchia fagi</i> (Scopoli, 1763)	Sylvandre	++		++								
Nymphalidae	<i>Hipparchia semele</i> (Linnaeus, 1758)	Agreste	++										
Nymphalidae	<i>Hipparchia statilinus</i> (Hufnagel, 1766)	Faune*	++										
Nymphalidae	<i>Lasiommata maera</i> (Linnaeus, 1758)	Némusien	++										
Nymphalidae	<i>Limenitis populi</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Sylvain			++								
Nymphalidae	<i>Lopinga achine</i> (Scopoli, 1763)	Bacchante			++								
Nymphalidae	<i>Melitaea diamina</i> (Lang, 1789)	Mélitée noirâtre		++	+								
Nymphalidae	<i>Melitaea didyma</i> (Esper, 1778)	Mélitée orangée	++										
Nymphalidae	<i>Melitaea parthenoides</i> (Keferstein, 1851)	Mélitée de la Lancéole	++	+									
Nymphalidae	<i>Minois dryas</i> (Scopoli, 1763)	Grand Nègre des bois	++	++	+								
Zygaenidae	<i>Zygaena lonicerae</i> (Scheven, 1777)	Zygène des bois			++								
Zygaenidae	<i>Zygaena minos</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Zygène diaphane	++										
Zygaenidae	<i>Zygaena osterodensis</i> (Reiss, 1921)	Zygène d'Ostérode			++								
Zygaenidae	<i>Zygaena sarpedon</i> (Hübner, 1790)	Zygène du Panicaut	++										
Zygaenidae	<i>Zygaena viciae</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Zygène des Thérésiens	++		+								

\* : espèces présumées disparues en région

« ++ » : espèce appartenant à l'éco-complexe considéré ; « + » : espèce présente dans l'éco-complexe considéré mais de manière marginale.

	Sensibilité faible
	Sensibilité moyenne
	Sensibilité forte

**Tableau des périodes d'intervention en faveur des papillons de jour**

*Travaux d'entretien*

Famille du taxon	Nom latin du taxon	Nom vernaculaire du taxon	Descripteurs	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre
Hesperiidae	<i>Carcharodus floccifer</i> (Zeller, 1847) <i>Betonica officinalis</i>	Hespérie du Marrube*	Vol imago Chenille dans un abri au pied de la plante Chrysalide, cocon avec 2 feuilles Dvpt / Floraison Sensibilité de l'espèce		X X X	X X X X X Dv Dv F	X X X X X F F F F	X X X X X	X X X X X	X X X	
Hesperiidae	<i>Hesperia comma</i> (Linnaeus, 1760)	Virgule	Vol imago Chenille dans un abri au pied de la plante Chrysalide, cocon dans une touffe de plante hôte Sensibilité de l'espèce		X X X	X X X	X X X	X X X X X	X X X	X X X	
Hesperiidae	<i>Pyrgus alveus</i> (Hübner, 1803)	Hespérie du Faux-Buis*	Vol imago Chenille dans un abri au pied de la plante Chrysalide au sol sous les feuilles Sensibilité de l'espèce		X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X	
Hesperiidae	<i>Pyrgus armoricanus</i> (Oberthür, 1910)	Hespérie des Potentilles	Vol imago Chenille dans un abri au pied de la plante Chrysalide au sol sous les feuilles Sensibilité de l'espèce		X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X
Hesperiidae	<i>Pyrgus cirsii</i> (Rambur, 1839)	Hespérie des Cirses*	Vol imago Chenille dans un abri au pied de la plante Chrysalide au sol sous les feuilles Sensibilité de l'espèce		X X X	X X X	X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X	
Hesperiidae	<i>Pyrgus serratalae</i> (Rambur, 1839)	Hespérie de l'Alchémille	Vol imago Chenille dans un abri au pied de la plante Chrysalide au sol sous les feuilles Sensibilité de l'espèce		X X X	X X X X X	X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X	
Pieridae	<i>Euchloe crameri</i> (Butler, 1869)	Piérade des Biscutelles	Vol imago Chenille dans fleurs puis les siliques Chrysalide sur tige de plante hôte Sensibilité de l'espèce	X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X
Pieridae	<i>Pontia daplidice</i> (Linnaeus, 1758)	Marbré-de-vert	Vol imago Sensibilité de l'espèce	X X X ? ? ?	X X X ? ? ?	X X X ? ? ?	X X X ? ? ?	X X X ? ? ?	X X X ? ? ?	X X X ? ? ?	X X X ? ? ?
Lycaenidae	<i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802)	Cuivré des marais	Vol imago Chenille en activité sur feuille Chrysalide au pied de la plante Sensibilité de l'espèce		X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	X
Lycaenidae	<i>Phengaris alcon</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) <i>Gentiana pneumonanthe</i>	Azuré de la Pulmonaire	Vol imago Œufs/Chenille dans les fleurs Dvpt / Floraison Sensibilité de l'espèce et ses hôtes				X Dv Dv Dv	X X X Dv Dv/F F	X X X F F F F	X X X F F F F	F F
Lycaenidae	<i>Phengaris arion</i> (Linnaeus, 1758) <i>Origanum vulgare</i>	Azuré du Serpolet	Vol imago Œufs/Chenille dans les fleurs Dvpt / Floraison Sensibilité de l'espèce et ses hôtes			X Dv Dv/F F	X X X X X X	X X X F F F F	X X X F F F F	X X X F F F F	
Lycaenidae	<i>Phengaris teleius</i> (Bergsträsser, 1779) <i>Sanguisorba officinalis</i>	Azuré de la Sanguisorbe	Vol imago Œufs/Chenille dans les fleurs Dvpt / Floraison Sensibilité de l'espèce et ses hôtes				X Dv Dv Dv/F	X X X F F F F	X X X F F F F	X X X F F F F	
Lycaenidae	<i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré de l'Ajonc	Vol imago Œufs/Chenille sur plantes hôtes Sensibilité de l'espèce et ses hôtes	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
Lycaenidae	<i>Plebejus idas</i> (Linnaeus, 1760)	Azuré du Genêt	Vol imago Œufs/Chenille sur plantes hôtes Sensibilité de l'espèce et ses hôtes	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
Lycaenidae	<i>Pseudophilotes baton</i> (Bergsträsser, 1779) <i>Thymus</i>	Azuré du Thym	Vol imago Œufs/Chenille dans les fleurs Dvpt / Floraison Sensibilité de l'espèce et ses hôtes			X X X Dv Dv/F F	X X X F F F F	X X X F F F F	X X X F F F F	X X X F F F F	
Lycaenidae	<i>Satyrrium acaciae</i> (Fabricius, 1787)	Thécla de l'Amarel	Vol imago Chrysalide sur branche ou dans litière Sensibilité de l'espèce			X X X	X X X	X X X			
Nymphalidae	<i>Arethusana arethusia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Mercure	Vol imago Chrysalide semi-enterrée Sensibilité de l'espèce					X X X X X X	X X X X X X	X X X	
Nymphalidae	<i>Boloria euphrosyne</i> (Linnaeus, 1758)	Grand collier argenté	Vol imago Chenille en activité sur <i>Viola</i> Chrysalide dans litière Sensibilité de l'espèce	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
Nymphalidae	<i>Boloria selene</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Petit Collier argenté	Vol imago Chenille en activité sur <i>Viola</i> Chrysalide suspendue à une plante basse Sensibilité de l'espèce	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
Nymphalidae	<i>Brenthis ino</i> (Rottemburg, 1775)	Nacré de la Sanguisorbe	Vol imago Chenille en activité au pied de la plante Chrysalide suspendue dans la végétation basse Sensibilité de l'espèce	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X
Nymphalidae	<i>Chazara briseis</i> (Linnaeus, 1764)	Hermite	Vol imago Chenille en activité Chrysalide légèrement enterrée Sensibilité de l'espèce		X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
Nymphalidae	<i>Coenonympha hero</i> (Linnaeus, 1760)	Mélibée*	Vol imago Chenille en activité Chrysalide suspendue près du sol Sensibilité de l'espèce		X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
Nymphalidae	<i>Coenonympha oedippus</i> (Fabricius, 1787)	Fadet des Laïches*	Vol imago Chenille en activité Chrysalide suspendue près du sol Sensibilité de l'espèce		X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
Nymphalidae	<i>Erebia aethiops</i> (Esper, 1777)	Moiré sylvicole	Vol imago Chrysalide dans une touffe de plante hôte Sensibilité de l'espèce					X X X	X X X	X	
Nymphalidae	<i>Erebia medusa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Moiré franconien*	Vol imago Chrysalide dans une touffe de plante hôte Sensibilité de l'espèce		X X	X X	X X X				

**Tableau des périodes d'intervention en faveur des papillons de jour**

*Travaux d'entretien*

Famille du taxon	Nom latin du taxon	Nom vernaculaire du taxon	Descripteurs	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre
Nymphalidae	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	Damier de la Succise	Vol imago Chenille en activité / Toile communautaire (T) Chrysalide Dvpt / Floraison Sensibilité de l'espèce et ses hôtes	T T T	X X X X X	X X X X X Dv Dv	X X X X X X Dv Dv Dv	X X X X X X F F F	X X X X X X F F F	T T T	T T T
Nymphalidae	<i>Euphydryas maturna</i> (Linnaeus, 1758)	Damier du Frêne	Vol imago Chenille en activité / Toile communautaire (T) Chrysalide Sensibilité de l'espèce		X X X	X X X X X	X X X X X X	T T T T T			
Nymphalidae	<i>Hipparchia fagi</i> (Scopoli, 1763)	Sylvandre	Vol imago Chrysalide enterrée dans le sol Sensibilité de l'espèce			X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X	
Nymphalidae	<i>Hipparchia semele</i> (Linnaeus, 1758)	Agreste	Vol imago Chrysalide enterrée dans le sol Sensibilité de l'espèce			X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X	
Nymphalidae	<i>Hipparchia statilinus</i> (Hufnagel, 1766)	Faune*	Vol imago Chrysalide enterrée dans le sol Sensibilité de l'espèce				X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X	X X
Nymphalidae	<i>Lasiommata maera</i> (Linnaeus, 1758)	Némusien	Vol imago Chenille en activité Chrysalide dans une touffe d'herbe ou rocher Sensibilité de l'espèce	X X X	X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X	X X X
Nymphalidae	<i>Limnitis populi</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Sylvain	Vol imago Chrysalide suspendue à une branche Sensibilité de l'espèce			X X X X X	X X X X X X	X X X X			
Nymphalidae	<i>Lopinga achine</i> (Scopoli, 1763)	Bacchante	Vol imago Chenille en activité Chrysalide suspendue dans la végétation basse Sensibilité de l'espèce et ses hôtes	X	X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X	X X X
Nymphalidae	<i>Melitaea diamina</i> (Lang, 1789)	Mélitée noirâtre	Vol imago Chenille en activité / Toile communautaire (T) Chrysalide suspendue sous une feuille basse Sensibilité de l'espèce	T T T	X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	T T T	T T T
Nymphalidae	<i>Melitaea didyma</i> (Esper, 1778)	Mélitée orangée	Vol imago Chenille en activité Chrysalide suspendue à une plante basse Sensibilité de l'espèce	X X X	X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X	X X X
Nymphalidae	<i>Melitaea parthenoides</i> (Keferstein, 1851)	Mélitée de la Lancéole	Vol imago Chenille en activité / Toile communautaire (T) Chrysalide suspendue à une plante basse Sensibilité de l'espèce	T T T	X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X T	T T T
Nymphalidae	<i>Minois dryas</i> (Scopoli, 1763)	Grand Nègre des bois	Vol imago Chrysalide dissimulée dans litière Sensibilité de l'espèce				X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	X	
Zygaenidae	<i>Zygaena lonicerae</i> (Scheven, 1777)	Zygène des bois	Vol imago Chenille en activité sur plante hôte Chrysalide sur tige et branches fines Sensibilité de l'espèce	X X X	X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X		
Zygaenidae	<i>Zygaena minos</i> (Denis & Schiffmüller, 1777)	Zygène diaphane	Vol imago Chenille en activité sur plante hôte Chrysalide dans la végétation basse Sensibilité de l'espèce	X X X	X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X		
Zygaenidae	<i>Zygaena osterodensis</i> (Reiss, 1921)	Zygène d'Ostérode	Vol imago Chenille en activité sur plante hôte Chrysalide sur tronc et branches fines Sensibilité de l'espèce	X X X	X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X		
Zygaenidae	<i>Zygaena sarpedon</i> (Hübner, 1790)	Zygène du Panicaut	Vol imago Chrysalide sur le dessous des plantes hôtes Sensibilité de l'espèce			X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X X		
Zygaenidae	<i>Zygaena viciae</i> (Denis & Schiffmüller, 1777)	Zygène des Thérésiens	Vol imago Chenille en activité sur plante hôte Chrysalide sur tige Sensibilité de l'espèce	X X X	X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X X	X X X X X X		

**Tableau des périodes d'intervention en faveur des papillons de jour**

*Travaux d'entretien  
Milieux ouverts secs à mesophiles*

Famille du taxon	Nom latin du taxon	Nom vernaculaire du taxon	Descripteurs	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre
Hesperiidae	<i>Carcharodus floccifer</i> (Zeller, 1847)  <i>Betonica officinalis</i>	Hespérie du Marrube*	Vol imago Chenille dans un abri au pied de la plante Chrysalide, cocon avec 2 feuilles Dvpt / Floraison Sensibilité de l'espèce		X X X	X X	X X X	X X	X X	X X X	
Hesperiidae	<i>Hesperia comma</i> (Linnaeus, 1760)	Virgule	Vol imago Chenille dans un abri au pied de la plante Chrysalide, cocon dans une touffe de plante hôte Sensibilité de l'espèce		X X X	X X X	X X X	X X	X X X	X X X	
Hesperiidae	<i>Pyrgus alveus</i> (Hübner, 1803)	Hespérie du Faux-Buis*	Vol imago Chenille dans un abri au pied de la plante Chrysalide au sol sous les feuilles Sensibilité de l'espèce		X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
Hesperiidae	<i>Pyrgus armoricanus</i> (Oberthür, 1910)	Hespérie des Potentilles	Vol imago Chenille dans un abri au pied de la plante Chrysalide au sol sous les feuilles Sensibilité de l'espèce		X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X
Hesperiidae	<i>Pyrgus cirsii</i> (Rambur, 1839)	Hespérie des Cirses*	Vol imago Chenille dans un abri au pied de la plante Chrysalide au sol sous les feuilles Sensibilité de l'espèce		X X X	X X X	X X X	X X	X X X	X X X	
Hesperiidae	<i>Pyrgus serratalae</i> (Rambur, 1839)	Hespérie de l'Alchémille	Vol imago Chenille dans un abri au pied de la plante Chrysalide au sol sous les feuilles Sensibilité de l'espèce		X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
Pieridae	<i>Euchloe crameri</i> (Butler, 1869)	Piérade des Biscutelles	Vol imago Chenille dans fleurs puis les siliques Chrysalide sur tige de plante hôte Sensibilité de l'espèce	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X
Pieridae	<i>Pontia daplidice</i> (Linnaeus, 1758)	Marbré-de-vert	Vol imago Sensibilité de l'espèce	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X
Lycaenidae	<i>Phengaris arion</i> (Linnaeus, 1758)  <i>Origanum vulgare</i>	Azuré du Serpolet	Vol imago Œufs/Chenille dans les fleurs Dvpt / Floraison Sensibilité de l'espèce et ses hôtes			X	X X X	X X X	X X X	X X X	
Lycaenidae	<i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré de l'Ajonc	Vol imago Œufs/Chenille sur plantes hôtes Sensibilité de l'espèce et ses hôtes	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
Lycaenidae	<i>Plebejus idas</i> (Linnaeus, 1760)	Azuré du Genêt	Vol imago Œufs/Chenille sur plantes hôtes Sensibilité de l'espèce et ses hôtes	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
Lycaenidae	<i>Pseudophilotes baton</i> (Bergsträsser, 1779)  <i>Thymus</i>	Azuré du Thym	Vol imago Œufs/Chenille dans les fleurs Dvpt / Floraison Sensibilité de l'espèce et ses hôtes			X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
Lycaenidae	<i>Satyrrium acaciae</i> (Fabricius, 1787)	Thécla de l'Amarel	Vol imago Chrysalide sur branche ou dans litière Sensibilité de l'espèce			X	X X X	X X X	X X X	X X X	
Nymphalidae	<i>Arethusana arethusa</i> (Denis & Schiffermüller)	Mercure	Vol imago Chrysalide semi-enterrée Sensibilité de l'espèce					X X X	X X X	X X X	
Nymphalidae	<i>Chazara briseis</i> (Linnaeus, 1764)	Hermite	Vol imago Chenille en activité Chrysalide légèrement enterrée Sensibilité de l'espèce		X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
Nymphalidae	<i>Erebia medusa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Moiré franconien*	Vol imago Chrysalide dans une touffe de plante hôte Sensibilité de l'espèce		X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
Nymphalidae	<i>Hipparchia fagi</i> (Scopoli, 1763)	Sylvandre	Vol imago Chrysalide enterrée dans le sol Sensibilité de l'espèce			X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
Nymphalidae	<i>Hipparchia semele</i> (Linnaeus, 1758)	Agreste	Vol imago Chrysalide enterrée dans le sol Sensibilité de l'espèce			X	X X X	X X X	X X X	X X X	
Nymphalidae	<i>Hipparchia statilinus</i> (Hufnagel, 1766)	Faune*	Vol imago Chrysalide enterrée dans le sol Sensibilité de l'espèce				X X	X X X	X X X	X X X	X X
Nymphalidae	<i>Lasiommata maera</i> (Linnaeus, 1758)	Némusien	Vol imago Chenille en activité Chrysalide dans une touffe d'herbe ou rocher Sensibilité de l'espèce	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
Nymphalidae	<i>Melitaea didyma</i> (Esper, 1778)	Mélictée orangée	Vol imago Chenille en activité Chrysalide suspendue à une plante basse Sensibilité de l'espèce	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X
Nymphalidae	<i>Melitaea parthenoides</i> (Keferstein, 1851)	Mélictée de la Lancéole	Vol imago Chenille en activité / Toile communautaire (T) Chrysalide suspendue à une plante basse Sensibilité de l'espèce	T T T	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	T T T
Nymphalidae	<i>Minois dryas</i> (Scopoli, 1763)	Grand Nègre des bois	Vol imago Chrysalide dissimulée dans litière Sensibilité de l'espèce				X X X	X X X	X X X	X X X	
Zygaenidae	<i>Zygaena minos</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Zygène diaphane	Vol imago Chenille en activité sur plante hôte Chrysalide dans la végétation basse Sensibilité de l'espèce	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
Zygaenidae	<i>Zygaena osterodensis</i> (Reiss, 1921)	Zygène d'Ostérode	Vol imago Chenille en activité sur plante hôte Chrysalide sur tronc et branches fines Sensibilité de l'espèce	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
Zygaenidae	<i>Zygaena sarpedon</i> (Hübner, 1790)	Zygène du Panicaut	Vol imago Chrysalide sur le dessous des plantes hôtes Sensibilité de l'espèce			X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
Zygaenidae	<i>Zygaena viciae</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Zygène des Thérésiens	Vol imago Chenille en activité sur plante hôte Chrysalide sur tige Sensibilité de l'espèce	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	

**Tableau des périodes d'intervention en faveur des papillons de jour**

*Travaux d'entretien*

*Forêts*

Famille du taxon	Nom latin du taxon	Nom vernaculaire du taxon	Descripteurs	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre
Nymphalidae	<i>Boloria euphrosyne</i> (Linnaeus, 1758)	Grand collier argenté	Vol imago Chenille en activité sur <i>Viola</i> Chrysalide dans litière Sensibilité de l'espèce	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
Nymphalidae	<i>Boloria selene</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Petit Collier argenté	Vol imago Chenille en activité sur <i>Viola</i> Chrysalide suspendue à une plante basse Sensibilité de l'espèce	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X		
Nymphalidae	<i>Coenonympha hero</i> (Linnaeus, 1760)	Mélibée*	Vol imago Chenille en activité Chrysalide suspendue près du sol Sensibilité de l'espèce		X X X	X X X	X X X	X X X	X X X		
Nymphalidae	<i>Erebia aethiops</i> (Esper, 1777)	Moiré sylvicole	Vol imago Chrysalide dans une touffe de plante hôte Sensibilité de l'espèce					X X X	X X X	X	
Nymphalidae	<i>Erebia medusa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Moiré franconien*	Vol imago Chrysalide dans une touffe de plante hôte Sensibilité de l'espèce		X X	X X	X X X				
Nymphalidae	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)  <i>Succisa pratensis</i>	Damier de la Succise	Vol imago Chenille en activité / Toile communautaire Chrysalide Dvpt / Floraison Sensibilité de l'espèce et ses hôtes	T T T	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	T T T	T T T
Nymphalidae	<i>Euphydryas maturna</i> (Linnaeus, 1758)	Damier du Frêne	Vol imago Chenille en activité au sol / Toile communautaire Chrysalide Sensibilité de l'espèce		X X X	X X X	X X X	T T T	T T T		
Nymphalidae	<i>Hipparchia fagi</i> (Scopoli, 1763)	Sylvandre	Vol imago Chrysalide enterrée dans le sol Sensibilité de l'espèce			X X X	X X X	X X X	X X X	X	
Nymphalidae	<i>Limenitis populi</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Sylvain	Vol imago Chrysalide suspendue à une branche Sensibilité de l'espèce			X X X	X X X	X X X			
Nymphalidae	<i>Lopinga achine</i> (Scopoli, 1763)	Bacchante	Vol imago Chenille en activité Chrysalide suspendue dans la végétation basse Sensibilité de l'espèce et ses hôtes		X X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
Zygaenidae	<i>Zygaena lonicerae</i> (Scheven, 1777)	Zygène des bois	Vol imago Chenille en activité sur plante hôte Chrysalide sur tige et branches fines Sensibilité de l'espèce	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X		
Zygaenidae	<i>Zygaena osterodensis</i> (Reiss, 1921)	Zygène d'Ostérode	Vol imago Chenille en activité sur plante hôte Chrysalide sur tronc et branches fines Sensibilité de l'espèce	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X		

**Tableau des périodes d'intervention en faveur des papillons de jour**

*Travaux d'entretien*

*Milieux humides*

Famille du taxon	Nom latin du taxon	Nom vernaculaire du taxon	Descripteurs	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre
Lycaenidae	<i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802)	Cuivré des marais	Vol imago Chenille en activité sur feuille Chrysalide au pied de la plante Sensibilité de l'espèce	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X
Lycaenidae	<i>Phengaris alcon</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) <i>Gentiana pneumonanthe</i>	Azuré de la Pulmonaire	Vol imago Œufs/Chenille dans les fleurs Dvpt / Floraison Sensibilité de l'espèce et ses hôtes					X X X	X X X	X X X	X
Lycaenidae	<i>Phengaris teleius</i> (Bergsträsser, 1779) <i>Sanguisorba officinalis</i>	Azuré de la Sanguisorbe	Vol imago Œufs/Chenille dans les fleurs Dvpt / Floraison Sensibilité de l'espèce et ses hôtes					X X X	X X X	X X X	X
Lycaenidae	<i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré de l'Ajonc	Vol imago Œufs/Chenille sur plantes hôtes Sensibilité de l'espèce et ses hôtes	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X
Nymphalidae	<i>Brenthis ino</i> (Rottemburg, 1775)	Nacré de la Sanguisorbe	Vol imago Chenille en activité au pied de la plante Chrysalide suspendue dans la végétation basse Sensibilité de l'espèce	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X
Nymphalidae	<i>Coenonympha hero</i> (Linnaeus, 1760)	Mélibée*	Vol imago Chenille en activité Chrysalide suspendue près du sol Sensibilité de l'espèce		X X X	X X X	X X X	X X X	X X X		
Nymphalidae	<i>Coenonympha oedippus</i> (Fabricius, 1787)	Fadet des Laïches*	Vol imago Chenille en activité Chrysalide suspendue près du sol Sensibilité de l'espèce		X X X	X X X	X X X	X X X	X X X		
Nymphalidae	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775) <i>Succisa pratensis</i>	Damier de la Succise	Vol imago Chenille en activité / Toile communautaire Chrysalide Dvpt / Floraison Sensibilité de l'espèce et ses hôtes	T T T	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	T T T	T T T
Nymphalidae	<i>Melitaea diamina</i> (Lang, 1789)	Mélitée noirâtre	Vol imago Chenille en activité / Toile communautaire (T) Chrysalide suspendue sous une feuille basse Sensibilité de l'espèce	T T T	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	T T T	T T T
Nymphalidae	<i>Minois dryas</i> (Scopoli, 1763)	Grand Nègre des bois	Vol imago Chrysalide dissimulée dans litière Sensibilité de l'espèce				X X X	X X X	X X X	X	